



مہم برائے آگاہی : بچوں اور نوجوانوں میں کینسر کی ابتدائی علامات اور بروقت تشخیص۔

CARE



Together
by St. Jude™

together.stjude.org



مہم برائے کینسر آگاہی: بچوں اور نوجوانوں میں کینسر کی ابتدائی علامات۔ (بچوں کا کینسر قابل علاج ہے) "سلامتی"



م- مسلسل درد

مسلسل علامات کی صورت میں فوراً طبی مدد حاصل کریں۔ مسلسل جسم میں درد محسوس ہونا اور ہڈیوں کا آسانی سے ٹوٹ جانا۔



س- سوجن / گٹھلی

پیٹ اور کمر، سر اور گردن، بازو اور ٹانگوں، خسیوں اور غدود میں سوجن یا گٹھلی۔



ت- توازن اور عصبی علامات

توازن، چلنے یا بولنے میں تبدیلیاں، پچھلی صلاحیتوں میں کمی، ایک ہفتے سے زیادہ سر درد (الٹی کے ساتھ یا بغیر)، سر کا بڑا ہونا۔



ل- لمبے عرصے سے بخار

لمبے عرصے (دو ہفتوں سے زیادہ) تک بخار رہنا، وزن میں کمی، چوٹ کے بغیر جسم پر نیل پڑ جانا۔



ی - یرقان کی تبدیلیاں

یرقان اور جگر میں رسولی کا ظاہر ہونا، جلد کا پیلا پڑ جانا، تھکن اور کمزوری محسوس ہونا۔



ا - آنکھ کی تبدیلیاں

آنکھوں میں تبدیلی کا نظر آنا۔ آنکھ میں سفید دھبہ، نیا ٹیڑھا پن، بینائی کی کمی، آنکھ کا ابھرنا۔



PROJECT:

**" Promoting Early Diagnosis of Childhood Cancer
by Training Primary and Secondary Health Care professionals
in Punjab, Pakistan."**

CARE.

CHILDHOOD CANCER IS CURABLE.

C

**C- Childhood Cancer Awareness by Training
Primary and Secondary Health Care
Professionals.**

A

**A- Assessment Skills of On Time Early
Diagnosis of Cancer in Children.**

R

R- Rapid Referrals to seek Medical Help.

E

**E- Enhanced Capacity of Health Care
Providers for Early Diagnosis
and Timely Referral From
Primary Care Level to
Tertiary Care Level.**

ASSESS

Medical history and physical examination

Assess the presence of one or more sign or symptoms. Immediately refer to pediatric ER or nearest health facility.

RED

Assess the presence of one or more sign or symptoms. Refer to hospital with a pediatric hematology-oncology unit within **48 to 72 hours.**

YELLOW

Assess the presence of one or more sign or symptoms. Conduct tests as necessary and refer to pediatric hematology-oncology

GREEN

Extracted from PAHO handbook



CLASSIFY BY FINDING

IMMEDIATE CARE:


Intense headache at night.
New onset seizures.
Loss of strength.
Unexplained petechiae or uncontrollable bleeding.

PRIORITY CARE:

Painless, Hard, Enlarged lymph nodes.
Night sweats, Fever, weight loss.
Leukocoria.
Persistent or recurrent vomiting.
Changes in behavior and school performance deterioration.

SCHEDULED CARE:

Generalized lymphadenopathy/ swelling.
Limping or joint pain/ bone pain.
Unexplained abdominal pain and
Persistent constipation,
Fatigue and pallor.
Unexplained fever more than 10 days and recurrent infections.



...چاہے آپ کہیں بھی ہوں ہم ٹوگیدر ہیں۔

ٹوگیدر **by St. Jude™** آن لائن ذریعہ بچپن اور نوعمری کے کینسر
کے بارے میں قابل اعتماد معلومات فراہم کرتا ہے۔



شیئر کردہ کہانیاں

ویڈیوز سے لے کر تحریری
کہانیوں تک، آپ ان لوگوں کے
تجربات اور بصیرت سے سیکھ
سکتے ہیں جو نگہداشت کے
ایسے سفر سے گزر چکے ہیں۔



عملی وسائل

دوا کے کارڈز سے لے کر بچوں
کے لیے موافق تعریفات تک، آپ
کو اپنی زندگی اور اپنے بچے کی
نگہداشت کے نظم و نسق میں
مدد کے لیے مفید وسائل تک
رسائی حاصل ہے۔



با اعتماد معلومات

تشخیص اور علاج سے لے کر
علامت کو نظم و نسق کرنے تک،
آپ قابل انحصار، سمجھنے میں
آسان معلومات تلاش کرسکتے
ہیں۔



مزید جاننے کے لیے اسکن کریں

together.stjude.org پر اضافی تعاون تلاش کریں۔

کئی زبانوں میں دستیاب

• ایکیوٹ لمفوبلاسٹک لیوکیمیا (ALL)

• دماغ کے ٹیومرز

• نیفروبلاسٹوما / ولمز ٹیومر

• ایونگ سارکوما / آسٹیوسارکوما


• لیور کینسر

• ریٹینوبلاسٹوما

• لیمفوما

• جرم سیل ٹیومرز

ایکیوٹ لمفوبلاسٹک لیوکیمیا خون اور ہڈی کے گودے میں ہونے والا
کینسر ہے۔ یہ بچوں میں ہونے والا سب سے عام کینسر ہے۔
یہ کینسر زیادہ تر 2 سے 5 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔



علامات:

• تھکاوٹ

• ہڈیوں یا جوڑوں میں درد

• بخار

• بار بار انفکشنز کا ہونا

• آسانی سے زخم لگ جانا اور خون کا مسلسل بہنا۔

• جلد پر سرخ دھبے (پٹیکیاے) ہونا۔

• گردن، بغل، پیٹ یا زانوں کے بیچ میں گٹھلی کا ہونا۔

• پسلیوں کے نیچے درد یا بھاری پن۔

• پیلاہن، بھوک نا لگنا۔

• سانس لینے میں دشواری، جگر کا بڑھ جانا۔

• تلی کا بڑھ جانا۔

تشخیص:

• خون کا ٹیسٹ (cbc)، ہڈی کے گودے کا
ٹیسٹ۔

لیمفوما، لمفاتی نظام (مدافعاتی نظام) کا ایک کینسر ہے۔

اقسام:

- 1- ہاجکن لیمفوما
- 2- نان ہاجکن لیمفوما

نان ہاجکن لیمفوما:

- نان ہاجکن لمفوما لمفاتی نظام کے کینسر کو کہتے ہیں جس میں پھولا ہوا لمف نوڈ موجود نہیں ہوتا۔
- کھانسی اور سانس لینے کے مسائل۔
- پیٹ کے دائیں حصے میں گٹھلی اور درد ہونا۔
- متلی اور الٹی آنا، جلد کا پیلا پن، جلد پر زخم بن جانا۔
- بڈیوں کا درد۔

تشخیص:

- جسمانی معائنہ، خون کے ٹیسٹ، بڈی اسکین۔

ہاجکن لیمفوما:

- گردن، سینہ، بغل یا کمر کی جگہ میں بغیر درد کے پھولا ہوا لمف نوڈز (گٹھلی) ہے۔
- غیر ضروری وزن میں کمی، رات کو زیادہ پسینہ آنا۔
- تین یا تین سے زیادہ دن کا بخار (104.4) ، بغیر کسی وجہ کے۔
- کھانسی یا سانس لینے میں مشکل آنا۔

تشخیص:

- خون کے ٹیسٹ، بائی اوپسی، بڈی کے گودے کا ٹیسٹ۔

• ہاجکن لیمفوما:



• برکیٹ لیمفوما:

برکیٹ لیمفوما ایک تیزی سے بڑھنے والا اور نہایت جارحانہ نوعیت کا بچپن میں پایا جانے والا سرطان ہے، جو عموماً پیٹ میں شروع ہوتا ہے۔ پیٹ میں رسولی بننے اور آنتوں میں رکاوٹ پیدا ہونے کے باعث اس کے علامات میں پیٹ درد، سوجن، متلی اور قے شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ نان ہاجکن لیمفوما کی ایک قسم ہے، جس کے علاج کے لیے فوری اور شدید کیموتھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ بعض مخصوص رسولیوں کے لیے سرجری بھی کی جا سکتی ہے۔



ریٹینوبلاستوما آنکھ میں ہونے والا کینسر ہے جو آنکھ کے ریٹینا میں بنتا ہے۔ یہ کینسر زیادہ تر چھوٹے بچوں اور عام طور پر 3 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے۔

ریٹینوبلاستوما کی علامات :

- پتلی میں ایک سفید چمک ، فلیش استعمال کیے جانے کے وقت یہ کسی تصویر میں دکھائی دے سکتا ہے۔ پتلی آنکھ کا مرکزی حصہ جو کہ سیاہ ہوتا ہے وہ اس کینسر سے متاثرہ بچوں میں کیمرے کی روشنی کی وجہ سے سرخ آنکھ کی بجائے **سفید پتلی کی رفلیکس یا بلی کی آنکھ جیسا** ہوتا ہے۔ یہ اس کینسر کی سب سے عام علامت ہے۔

- **آنکھ کا بھینگا پن** (سست پن)، آنکھ کے کینسر کی دوسری عام علامت ہے۔

- ایک آئرس (آنکھ کا رنگین حصہ) جو ایک مختلف رنگ کا ہوتا ہے۔

- بصارت میں مسائل۔


- سرخ اور جلن والی آنکھیں

- آنکھ میں ٹیومر کے بڑھنے کی وجہ سے آنکھ پر ڈباؤ پڑتا ہے اور درد کی وجہ سے الٹی اور قے ہوتی ہے۔


• تشخیص :

• ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی بچوں کے ماہر امراض آنکھ (بچوں کی آنکھوں کا ڈاکٹر) اور بچوں کی آنکھوں کے کینسر والے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔


• آنکھ کے کینسر کی تشخیص کے لیے طبی بسٹری ، آنکھ کا معائنہ ، آئی اوربٹ ٹیسٹ اور ایم-آر-آئی ضروری ہیں۔



- دماغ میں ہونے والے ٹیومرز کو برین ٹیومر کہا جاتا ہے۔ دماغ اور سپائنل کورڈ ٹیومرز، لیوکیمیا کے بعد بچوں میں ہونے والے دوسری سب سے عام قسم کے کینسر ہیں۔ یہ ٹیومرز بچوں میں ہونے والی اموات کی اہم وجہ ہیں۔



برین ٹیومرز کی علامات :





- سر کا درد، متلی اور قے (خاص طور پر صبح کے وقت)
- بصارت میں کمی کے مسائل۔
- بولنے یا سننے میں کمی کے مسائل۔
- توازن کھو بیٹھنا، ہم آہنگی میں کمی کے مسائل یا چلنے میں دشواری۔
- بازووں یا پیروں میں کمزوری۔
- دورے پڑنا، شدید تھکاوٹ محسوس کرنا۔
- غیر معمولی وزن میں تبدیلی۔
- ہارمونز میں ہوئی تبدیلیوں سے متعلق علامات جیسے پیاس کا زیادہ لگنا، وقت سے پہلے بالغ ہونا۔
- شخصیت میں تبدیلیاں، سکول کی کارکردگی میں تبدیلیاں۔

- جسم کی کمزوری ، سن ہوجانا، جھنجھانا ،جسم کے ایک حصے بازو یا ٹانگ یا دونوں میں کمزوری اور تبدیلیاں محسوس کرنا ۔
- دائمی پیٹھ درد ، بیت الخلاء میں پریشانی ہونا (اسپائنل کارڈ ٹیومرز)۔
- اسکولیوسس (کمر کا ٹیڑھا پن، اسپائنل کارڈ ٹیومرز)۔
- سر کو ایک طرف جھکانا ، نوزائیدہ بچوں میں سر کا سائز بڑھ جانا۔

تشخیص:

- دماغ اور سپائنل کورڈ میں ہونے والے ٹیومرز کی علامات شروع میں واضح نہیں ہوسکتے ہیں اور انہیں شناخت کرنے میں مشکل ہوسکتی ہے۔
- اعصابی جانچ کے دماغ کے کام کرنے کے مختلف پہلو کو ماپتا ہے اور ان میں یادداشت ، دیکھنے ، سننے ، پٹھوں کی طاقت ، توازن ، ہم آہنگی شامل ہیں۔
- ایم-آر-آئی کنڈراسٹ کے ساتھ۔

- لیور پیٹ کے اوپر دائیں جانب ایک بڑا اور اہم عضو ہے۔ جگر کے کینسر میں جگر کے خلیے غیر معمولی طور پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک رسولی (ٹیومر) بنا لیتے ہیں جو کہ جگر کے اندر سے پیدا ہو سکتی ہے (پرائمری لیور کینسر) یا جسم کے کسی اور حصے سے پھیل کر جگر میں آسکتی ہے (سیکنڈری یا میٹاسٹیٹک لیور کینسر) کہتے ہیں۔






- لیور کینسر 1 سے 5 سال تک کی عمر میں پایا جاتا ہے۔

- پیٹ میں گٹھلی یا سوجن (اکثر بغیر کسی علامات کے ہوتا ہے۔)
- پیٹ یا کمر میں درد ۔
- بھوک نہ لگنا ، وزن میں کمی ۔
- جلد میں خارش ۔
- یرقانی تبدیلیاں (انکھ / جلد کا پیلاہن)
- متلی اور قے ہونا
- بخار
- ابتدائی بلوغت

تشخیص :

- ایم۔ آر۔ آئی ، ٹشو بائوپسی ، سی۔ ٹی سکین۔
- خون اور پیشاب کے ٹیسٹ۔
- ایلفا فیٹو پروٹین ٹیسٹ۔

- ایونگ سارکوما کینسر کی ایک قسم ہے جو کہ ہڈیوں اور ہڈیوں کے اردگرد نرم ٹشو میں پایا جاتا ہے۔ یہ کینسر اکثر ٹانگ، پسلیوں یا بازو میں ہوتا ہے۔
- ایونگ سارکوما زیادہ تر بڑے بچوں اور نوجوانوں (5 سال سے زیادہ کی عمر) میں پایا جاتا ہے۔



علامات :


- ٹیومر کی جگہ کے اردگرد سوجن ، گٹھلی یا درد محسوس ہونا۔
- بخار کا ہونا۔
- ہڈیوں میں درد اور تھکاوٹ خاص طور پر رات کے وقت۔
- چلنے میں مشکل پیش آنا۔
- ہڈی کا بلاوجہ ٹوٹ جانا۔
- درد ہفتوں یا مہینوں میں شدید ہوسکتا ہے اور رات میں بچوں کو بیدار کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔

تشخیص:

- ٹشو بائیوپسی۔
- خون کا ٹیسٹ (سی - بی - سی)
- ایل - ڈی - ایچ کا ٹیسٹ (یہ خون میں پایا جانے والا ایسا مادہ ہے جو اس کینسر میں بڑھ سکتا ہے)
- ایم - آر - آئی ، سی ٹی سکین ، پٹ سکین P.E.T scan ، ایکسرے ۔

• یہ شیرخوار میں پایا جانے والا سب سے زیادہ عام قسم کا گردے میں ہونے والا کینسر ہے۔ ولمز ٹیومر کو نیفروبلاستوما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر 5 سال سے کم عمر بچوں میں پایا جاتا ہے۔

• رینل سیل کارسینوما 15 سے 19 سال کی عمر کے درمیان بچوں میں گردے میں ہونے والا سب سے عام قسم کا ٹیومر ہے۔



گردے پیٹ کے پچھلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا اصل کام خون کو فلٹر اور صاف کرنا اور پیشاب بنانا ہے۔

علامات :

- پیٹ میں درد، گٹھلی اور سوجن کا ہونا۔
- پیشاب میں خون آنا۔
- ہائی بلڈ شوگر کا ہونا۔
- بخار کا ہونا۔
- بھوک کا نہ لگنا، وزن میں کمی، قبض کا علاج سے ختم نہ ہونا۔
- غیر ضروری تھکاوٹ، الجھن، بے حد پیاس کا لگنا، الٹی کا آنا۔

تشخیص :

- کینسر کی طبی ہسٹری اور جسمانی معائینہ۔
- خون اور پیشاب کے لیب ٹیسٹ۔
- جگر اور گردے کے ٹیسٹ۔
- ایلیکٹرو لائٹ ٹیسٹ۔
- سی-ٹی سکین
- ایم-آر-ئی ٹیسٹ۔

- جرم سیل وہ خصوصی خلیے ہیں جو انسان کی پیدائش سے پہلے بنتے ہیں اور بعد میں خصیے (Testes) یا بیضہ دانی (Ovaries) میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب ان خلیوں میں کسی وجہ سے نارمل نشونما نہ ہو سکے تو وہ ایک رسولی یا ٹیومر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جرم سیل ٹیومر کہلاتے ہیں۔
- یہ عام طور پر 1 سال سے 4 سال کی عمر یا 14 سے 15 سال کی عمر میں پائے جا سکتے ہیں۔
- یہ بچوں میں پایا جانے والا عام کینسر ہے۔



تشخیص:

- فیملی ہسٹری، بائیوپسی۔
- خون کے ٹیسٹ۔ ان میں الفافیٹوپروٹین (AFP) اور بیٹا ہیومن کورونک گوناڈوٹروپن (β -HCG) شامل ہے۔
- الٹراساؤنڈز، ایم آر آئی۔
- کمپیوٹڈ ٹوموگرافی (CT یا CAT اسکین)، (PET) اسکین۔

Ovarian / بیضہ دانی کا کینسر / (Cancer

علامات:


- پیٹ میں ہاتھ سے محسوس ہونے والی گانٹھ، جو اچانک پیدا ہونے والی شدید علامات کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور بغیر کسی نمایاں علامت کے بھی۔ اس کے ساتھ پیشاب کا بالکل بند ہو جانا یا بہت کم مقدار میں آنا - یہ اکثر اووری کے مڑ جانے (اوورین ٹورشن) کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
- مسلسل قبض رہنا / بلا وجہ پیٹ میں درد رہنا۔
- ماہواری کے علاوہ غیر معمولی اندام نہانی خون یا خونی مادہ آنا - یعنی غیر معمولی یا خونی ڈسچارج / خون آنا



جرم سیل ٹیومر (خصیوں کا ٹیومر / Testicular Cancer)

علامات:

- خصیے یا سکروٹم میں بتدریج بڑھتی ہوئی سوجن یا سخت گانٹھ – ایسی گانٹھ جو نرم تھیلی (جیسے پانی بھرے تھیلی) نہ ہو بلکہ ٹھوس محسوس ہو۔
- سوزش یا انفیکشن (inflammation / infection) کی کوئی واضح علامت نہ ہونا – یعنی گانٹھ کے اردگرد لالی، بخار کا نہ ہونا۔
- سکروٹم یا خصیے میں تکلیف یا درد – کبھی ہلکا سا بوجھ محسوس ہونا، بھاری پن، مستقل یا کبھی کبھار درد۔



تشخیصی امیجنگ ٹیسٹ

لیبارٹری (پیتھالوجی) ٹیسٹ

- ایکسرے /
فلوروسکوپ
- الٹراساؤنڈ
(سونوگرافی)
- *CT* اسکین
- *PET* اسکین
- *MRI*
- جوہری
ادویات کا اسکین

- خون کے ٹیسٹس
- پیشاب کے ٹیسٹ
- بون میرو
اسپائریشن (ہڈی کا
گودا نکالنا) اور
بایوپسی
- ٹیومر بائیوپسی
- لمبر پنکچر

